

## KULLANMA TALİMATI

### ZAYON 60 mg film kaplı tablet

Ağız yolu ile alınır.

- **Etkin madde:** Her bir tablet 60 mg dapoksetine eşdeğer 67,171 mg dapoksetin hidroklorür içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Laktoz monohidrat (sığır kaynaklı), mikrokristalin selüloz 101, kroskarmelloz sodyum, hidroksipropil metil selüloz, koloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, deiyonize su ve instacoat universal gri içerir.  
**Kaplama maddesi:** İnstacoat universal gri (hidroksipropil metil selüloz, laktoz, triasetin, titanyum dioksit, sarı demir oksit, siyah demir oksit).

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **ZAYON nedir ve ne için kullanılır?**
2. **ZAYON'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **ZAYON nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **ZAYON'un saklanması**

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. ZAYON nedir ve ne için kullanılır?**

- ZAYON'un 60 mg'lık tabletleri gri renkli, yuvarlak, bikonveks tabletlerdir.
- Hayvansal kaynaklı laktoz monohidrat (sığır kaynaklı) içermektedir.



- ZAYON, 18-64 yaşları arasındaki yetişkin erkeklerde eşleriyle cinsel ilişkisini etkileyecek şekilde sık görülen erken boşalma (prematür ejakülasyon) durumunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.
- ZAYON etkin madde olarak dapoksetin içerir. Bu seçici serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) olarak adlandırılan ve diğer ürolojik ilaçlar olarak adlandırılan gruba dahil bir ilaçtır.
- ZAYON sizin boşalmanıza kadar geçen süreyi uzatır; boşalmayı kontrol edebilmenizi sağlar. Bu sizin hızlı boşalmanızdan dolayı olan hayal kırıklığı ve sıkıntılarınızı azaltır.

## **2. ZAYON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **ZAYON’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

- Dapoksetin hidroklorür ya da ilacın bileşimindeki herhangi bir diğer maddeye alerjiniz veya aşırı hassasiyetiniz olduğu biliniyorsa,
- Kalp yetmezliği gibi ya da kalbinizin ritmi ile ilgili kalp sorunlarınız varsa,
- Geçmişte bayılmalarınız olmuşsa,
- Mani olarak adlandırılan bir hastalığınız (belirtileri arasında aşırı coşku, huzursuzluk veya berrak bir şekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur) veya ağır bir bunalımınız (depresyon) varsa,
- Eğer aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız:
  - Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoamin oksidaz inhibitörü) olarak adlandırılan türden ilaçlar.
  - Tioridazin - ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır.
  - Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
  - Lityum – bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum) tedavisinde kullanılır.
  - Linezolid – bazı mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bir antibiyotiktir.
  - Triptofan – uyku bozukluklarında kullanılan bir ilaçtır.
  - Sarı kantaron (St.John’s Wort-Hypericum perforatum) - bitkisel bir ilaçtır.
  - Tramadol – şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır
  - Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar.

Yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız ZAYON kullanmayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini daha önceden almışsanız, ZAYON kullanmaya başlamadan 14



gün öncesinde bu ilaçları kesmiş olmalısınız. Aynı şekilde ZAYON kullanırken bu ilaçları almak istiyorsanız, ZAYON'u kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Bunu nasıl yapacağınızı tam olarak anlamadıysanız doktor ya da eczacınızla konuşunuz (bkz. "**Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**" bölümü).

- Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan ketokonazol ve itrakonazol dahil bazı mantar ilaçları (bkz. "**Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**" bölümü).
- Ritonavir, sakuinavir, nelfinavir ve atazanavir dahil HIV virüsüne bağlı enfeksiyonları (AİDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar (bkz. "**Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**" bölümü).
- Telitromisin dahil mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler (bkz. "**Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**" bölümü).
- Nefazodon - Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır (bkz. "**Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**" bölümü).

– Karaciğerinizle ilgili orta şiddette ya da ağır problemlerinizi varsa.

Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığından emin değilseniz) ZAYON almadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz.

## **ZAYON'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

**Aşağıdaki durumlarda ZAYON'u kullanmadan önce doktor ya da eczacınıza danışınız.**

- Alkol kullanıyorsanız (bkz. "**ZAYON'un yiyecek ve içecek ile kullanılması**" bölümü);
- Sizde erken boşalma (prematür ejakülasyon) tanısı konulmamışsa;
- Ekstazi, LSD, narkotikler ya da benzodiazepin gibi keyif verici maddeleri kullanıyorsanız;
- Geçmişte bunalım (depresyon), manik bir durum (aşırı coşku, huzursuzluk veya berrak bir şekilde düşünememe gibi belirtiler bulunur), bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum) veya şizofreni gibi herhangi bir ruh hastalığı sorunuz olmuşsa;
- Geçmişte kanamayla seyreden bir hastalık veya pıhtılaşma bozukluğu geçirmişseniz;
- Herhangi bir böbrek sorunuz varsa;
- Epilepsi (sara) hastasıysanız;
- Kan basıncınızın düşmesine bağlı baş dönmeleriniz varsa;
- Midriyazis (göz bebeğinin normale göre daha büyük olması) ve göz ağrısı gibi etkiler ZAYON kullanımı ile ilişkilendirilmiştir. Yükselmiş göz içi basıncı (dar açılı glokom) riski olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.



- Erektile disfonksiyon (sertleşme bozukluğu) olarak adlandırılan diğere bir cinsel hastalığınız varsa.

Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi biri sizde varsa (ya da olup olmadığından emin değilseniz) ZAYON almadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz.

ZAYON kullanmaya başlamadan önce doktorunuz sizin kan basıncınızın yatar durumdayken ayağa kalktığınızda çok fazla düşüp düşmediğini belirlemek için size bir test uygulamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

### **ZAYON'un yiyecek ve içecek ile kullanılması:**

- Greyfurt suyu bu ilacın vücudunuzdaki seviyesini artırabileceğinden, bu ilacı almadan önce 24 saat içinde greyfurt suyu içmeyiniz.
- ZAYON yemeklerle birlikte ya da aç karnına alınabilir.
- ZAYON en az tam olarak dolu bir bardak suyla içilmelidir.
- ZAYON kullanırken alkol almayınız.
- ZAYON kullanırken alkol alınması durumunda, alkole bağlı gelişebilecek baş dönmesi, sersemlik hali ve reflekslerde yavaşlama gibi etkiler artabilir.
- ZAYON kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çıkabilecek bayılma ya da diğere yan etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

ZAYON yalnızca erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır.

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

ZAYON yalnızca erkeklerde kullanılır; kadınlar tarafından alınmamalıdır.

### **Araç ve makine kullanımı**

ZAYON kullanırken sizde uyku hali, baş dönmesi, sersemlik hissi, bayılma, dikkati toplamada güçlük ya da görmede bulanık görülebilir. Sizde bu türden ya da benzeri etkiler görülürse, araç ve makine kullanmamalısınız. Alkolün etkileri de ZAYON ile birlikte alındığında artar ve ZAYON kullanırken alkol alınması, bu durumda ortaya çıkabilecek bayılma ya da diğere yan etkilerden zarar görerek yaralanma riskinizi arttırır.

### **Çocuklarda kullanımı**

ZAYON yalnızca erişkin erkeklerde kullanılır; 18 yaş altındaysanız kullanmayınız.



### **İçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

ZAYON, laktoz (bir şeker türü) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Ayrıca bu ürün her bir tabletinde 1 mmol (23 mg)'dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Belirli ilaçlar sizde yan etki görülme riskini arttırabileceğinden eğer herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bu ilaçlar bitkisel olanlar dahil reçeteli ya da reçetesiz satılan ilaçlar olabilir. Çünkü ZAYON diğer ilaçlarla etkileşime girerek onların etkilerini değiştirebilir. Aynı zamanda bazı ilaçlar da ZAYON'un etkisini değiştirebilir. Bu nedenle diğer ilaçların kullanımı, almanıza izin verilen en yüksek ZAYON dozunun ne kadar olması gerektiği konusunda doktorunuza yön gösterecektir.

ZAYON ile birlikte kullanılmaması gereken ilaçlar aşağıda listelenmiştir:

- Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan MAO inhibitörü (monoamin oksidaz inhibitörü) olarak adlandırılan türden ilaçlar.
- Tioridazin - ruhsal bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde kullanılır.
- Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar.
- Lityum - bipolar hastalık (mizaçta aşırı yükselme ve düşüşlerle seyreden bir durum) tedavisinde kullanılır.
- Linezolid – bazı mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bir antibiyotiktir.
- Triptofan – uyku bozukluklarında kullanılan bir ilaçtır.
- Sarı kantaron (St.John's Wort-Hypericum perforatum) - bitkisel bir ilaçtır.
- Tramadol – şiddetli ağrılarda kullanılan bir ilaçtır.
- Migren (zonklayıcı tarzda bir tür baş ağrısı) tedavisi için kullanılan ilaçlar.

Yukarıda listelenen ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız ZAYON kullanmayınız. Bu ilaçlardan herhangi birini daha önceden almışsanız, ZAYON kullanmaya başlamadan 14 gün öncesinde bu ilaçları kesmiş olmalısınız. Aynı şekilde ZAYON kullanırken bu ilaçları almak istiyorsanız, ZAYON'u kesip 7 gün beklemeniz gerekmektedir. Bunu nasıl yapacağınızı tam olarak anlamadıysanız ZAYON almaya başlamadan önce doktor ya da eczacınızla konuşunuz.

- Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan ketokonazol ve itrakonazol dahil bazı mantar ilaçları Ritonavir, sakuinavir, nelfinavir ve atazanavir dahil HIV virüsüne ba



enfeksiyonları (AİDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar.

- Telitromisin dahil mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler.
- Nefazodon - Bunalım (depresyon) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

ZAYON ile birlikte kullanıldıklarında sorun yaratan diğer bazı ilaçlar aşağıda listelenmiştir:

- Depresyon (bunalım) dışı diğer ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar.
- İbuprofen veya aspirin gibi inflamasyona karşı (ilhitaplı durum) kullanılan steroid olmayan ilaçlar.
- Kanınızı sulandırmada kullanılan varfarin gibi ilaçlar.
- Sildenafil, tadalafil veya vardenafil gibi erektil disfonksiyonu (sertleşme bozukluğu) tedavi etmek için kullanılan ilaçlar (bu ilaçlar kan basıncınızı, olasılıkla ayakta durur pozisyonda düşürebilir).
- Verapamil ve diltiazem gibi yüksek kan basıncınızı ve göğüs ağrınızı (anjina ağrısı) veya büyümüş prostat bezinizi tedavi etmek için kullanılan diğer bazı ilaçlar (bu ilaçlar kan basıncınızı, olasılıkla ayakta durur pozisyonda düşürebilir).
- Mantar hastalıklarını tedavi etmekte kullanılan flukonazol gibi bazı diğer mantar ilaçları
- Amprenavir ve fosamprenavir gibi HIV virüsüne bağlı enfeksiyonları (AİDS) tedavi etmekte kullanılan bazı ilaçlar.
- Eritromisin ve klaritromisin gibi mikrobik hastalıkları tedavi etmede kullanılan bazı antibiyotikler.
- Aprepitant - bulantı tedavisinde kullanılan bir ilaç.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. ZAYON nasıl kullanılır?**

ZAYON tableti daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz bunu doktorunuzla kontrol ediniz.

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

- Olağan dozu 30 mg'dır. Doktorunuz bu dozu gerek duyarsa 60 mg'a yükseltebilir.
- İlacı cinsel aktiviteden 1 ila 3 saat önce alınız.
- **24 saatte veya bir günde bir kereden fazla ZAYON almayınız.**
- 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük erkekseniz bu ilacı kullanmayınız.
- İlk 4 hafta ya da en az 6 doz kullandıktan sonra doktorunuzla tedaviye devam edin



etmeme konusunda görüşünüz. Eğer tedavinize devam etme kararı verilirse her 6 ayda bir doktorunuzla tedaviye devam edip etmeme konusunu tekrar görüşmelisiniz.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

- ZAYON'un acı tadını hissetmemek için bu ilacı en az bir tam dolu bardak suyla içiniz. Bu şekilde bayılma riskini de azaltırsınız. (bkz. Bölüm 4 “**Bayılma ve düşük kan basıncı**”)
- ZAYON yemeklerle birlikte ya da aç karnına alınabilir.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

65 yaşından büyüklerde kullanılmamalıdır. 65 yaşından küçüklerde erişkinlerdeki gibi kullanılır.

##### **Çocuklarda ve adolesanlarda kullanımı:**

18 yaşından küçüklerde veya adolesanlarda kullanılması önerilmez.

#### **Özel kullanım durumları:**

##### **Böbrek yetmezliği:**

Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği durumlarında doz ayarlamasına gerek duyulmaksızın kullanılabilir; ancak dikkatli olunmalıdır. Ağır böbrek yetmezliği varsa, kullanımı önerilmez.

##### **Karaciğer yetmezliği:**

Orta derecede ve şiddetli karaciğer yetmezliği durumlarında kullanılmamalıdır.

*Eğer ZAYON'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlemınız var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

#### **Kullanmanız gerekenden daha fazla ZAYON kullandıysanız:**

Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla ZAYON almanız durumunda kendinizi hasta hissedebilir veya hasta olabilirsiniz.

*ZAYON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

#### **ZAYON'u kullanmayı unutursanız**



ZAYON ancak gerektikçe alınan bir ilaç olduğundan kullanmayı unutmanız durumunda herhangi bir soruna yol açmaz.

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

#### **ZAYON ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

İlacınızı kullanmayı bırakmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Her gün kullanmıyor olsanız bile bu ilacı kullanmayı bıraktığınızda uykuya dalmada güçlük ve baş dönmesi gibi problemlerinizi olabilir.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi ZAYON'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, ZAYON'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Kasılmalarla seyreden nöbet geçirirseniz
- Ayağa kalktığınızda bayılır veya sersemlik hissederseniz
- Ruh halinizde herhangi değişiklik hissederseniz
- İntihar etmeyi ya da kendinize zarar vermeyi düşünmeye başlarsanız

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

#### **Bayılma ve düşük kan basıncı**

ZAYON ayağa kalktığınızda bayılmanıza ya da kan basıncınızda düşmeye yol açabilir. Bu durumların görülme riskini düşürmek için:

- ZAYON'u en az bir tam dolu bardak suyla içiniz.
- İlacı kullanırken vücudunuzun susuz kalmış olmamasına dikkat ediniz. Vücudunuz şu durumlarda susuz kalmış olabilir:
  - İlacı almadan önceki son 4-6 saat içinde herhangi içecek bir şey almamışsanız
  - Uzun bir süredir terlemekteyseniz
  - Ateş, ishal veya kusmayla seyreden bir hastalığınız varsa
- Kendinizi bayılacakmış gibi hissederseniz (kendinizi hasta gibi hissetmeniz, bir baş dönmesi / sersemlik hali oluşması, şuurda bulanıklık olması, terlemeniz ya da kalbinizde





anormal bir çarpıntı görülmesi) ya da ayağa kalktığınızda gözlerinizde kararma, bulantı, sendeleme gibi belirtiler oluşması durumunda hemen uzanarak başınızın vücudunuzun diğer bölgelerinden aşağıda kalmasını sağlayınız ya da başınızı dizlerinizin arasında tutacak şekilde oturunuz ve belirtiler düzeline kadar böyle kalınız. Bu sizi bir bayılma nöbeti geçirmekten ya da bayılırsanız düşmenizden ve yaralanmanızdan koruyacaktır.

- Uzun süredir oturuyor ya da yatar durumdaysanız hemen ayağa kalkmayınız.
- Bu ilacı aldığınızda baygınlık hissediyorsanız araç ve makina kullanmayınız.
- **Bu ilacı aldığınızda baygınlık hissediyorsanız doktorunuza söyleyiniz.**

### **Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

Yan etkiler sıklık derecelerine göre şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

### **Çok yaygın**

- Baş dönmesi
- Baş ağrısı
- Kendinizi hasta gibi hissetme

### **Yaygın**

- Kendini gergin hissetme, huzursuzluk, sinirlilik ya da yerinde duramama
- Uyuşma, karıncalanma veya iğne batma hissi
- Erkeklik organının sertleşmesinde ya da sertliğin korunmasında bozukluk
- Terlemede artış, al basması, yüzde kızarma, sıcak basması
- İshal, kabızlık veya gaz
- Mide ağrısı, şişkinlik ya da kendinizi hasta hissetme
- Uykusuzluk, uyku bozukluğu ya da değişik rüyalar görme
- Yorgun veya uykulu hissetme, esneme
- Burunda tıkanıklık
- Tansiyonda yükselme
- Dikkati toplamada güçlük



- Titreme veya sarsılma
- Cinsel istekte azalma
- Kulaklarda çınlama
- Görmede bulanıklık
- Hazımsızlık
- Ağız kuruluğu

### **Yaygın olmayan**

- Bayılma ya da ayağa kalkıldığında baş dönmesi (Yukarıda yer alan önerilere bakınız)
- Mizaç değişiklikleri, aşırı coşkulu hissetme ya da şüpheli hissetme (paranoya)
- Kendini kafası karışmış, uyumu bozulmuş ya da dikkati dağılmış olarak hissetme
- Kalp atışlarının yavaşlaması, düzensizleşmesi ya da hızlanması
- Cinsel isteğin azalması, orgazm (menin boşalması) olamama
- Kendini zayıf, uyuşuk, halsiz ya da yorgun hissetme
- Kendini bunalımda hissetmek, sinirlilik ya da kayıtsızlık hissi
- Sıcak basması, kendini gergin, anormal ya da içkili gibi hissetme
- Görmeye ilgili sorunlar, göz ağrısı ya da göz bebeklerinde büyüme
- Düşük ya da yüksek tansiyon
- Kaşıntı hissi ya da soğuk terleme
- Yerinde dönüyormuş hissi
- Anormal tat duyumu
- Diş gıcırdatma

### **Seyrek**

- Fiziksel faaliyet sonucu baş dönmesi hissi
- Ani uyku bastırması
- Ani bağırsak hareketlerinin başlaması ve tuvalete gitme ihtiyacı

Bunlar ZAYON'un hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

### **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız y



etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. ZAYON’un saklanması**

*ZAYON’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.  
25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

**Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra ZAYON’u kullanmayınız.*

*Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZAYON’u kullanmayınız.*

*Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre; Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.*

**Ruhsat sahibi:** Farma-Tek İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Ümraniye/İstanbul

**Üretim yeri:** Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.  
Başakşehir/İstanbul

*Bu kullanma talimatı .../.../... tarihinde onaylanmıştır.*

